

2023年3月6日

## 第131回触媒討論会におけるCOVID-19感染拡大防止対策

(感染防止対策マニュアル)

一般社団法人触媒学会  
討論会委員会

討論会委員会では、口頭発表が現地開催となりました第131回触媒討論会のCOVID-19感染拡大防止対策について以下にまとめました。

本討論会の開催に際しては、参加予定の皆様が安全確保が最優先と考えております。感染拡大防止対策実施の必要性を十分にご理解いただき、下記対策の実施にご協力をお願いいたします。

1. 下記に当てはまる場合、ご入場いただけません。

- ① 不織布マスク未着用の方
- ② 会場設置の検温機器にて体温 **37.5℃**以上（平熱が高めの人は平熱より**+0.5℃**以上）の発熱が確認された方
- ③ PCR 検査等で新型コロナウイルスの陽性判定があり、かつ行政が定める行動制限解除要件を満たしていない方
- ④ 新型コロナウイルス患者の濃厚接触者で、かつ行政が定める行動制限解除要件を満たしていない方
- ⑤ 下記（1）～（4）を含む体調不良のある方
  - (1) 体温 **37.5℃**以上（平熱が高めの人は平熱より**+0.5℃**以上）、または発熱症状の自覚がある
  - (2) 強い倦怠感
  - (3) 感冒様症状（咽頭痛、呼吸器症状、倦怠感、頭痛、消化器症状、鼻汁等）
  - (4) 味覚・嗅覚異常などの異変がある

注) 体調不良者は、解熱鎮痛剤などを服用せず、24時間ほぼ症状が見られずに経過した場合に再入場可とする。（それに加えて、症状軽快後48時間経過するまでは、換気・対人距離・不織布マスクの着用・不要な会話を控えるなど感染防止対策を徹底してください。）

2. 基本的な感染防止対策

- ① 出発前の毎朝の検温を実施すること。出発前の検温ができなかった場合は、会場のある建物入り口付近に設置された非接触式体温計で必ず検温する。

## ②口頭発表会場での感染防止対策

- ・ 会場へは不織布マスクを正しく着用して入場する。
  - ・ 各所に設置されているアルコール消毒液で手指消毒を行う。  
手洗いの場合、**30秒程度**かけて水と石鹸で丁寧に洗う。
  - ・ 会場では、できるだけ前後左右の座席をひとつ空けて座る。
  - ・ 定期的な換気を行うため、暖かい服装でお越してください。
  - ・ 対面で発言する場合は、十分な距離（できるだけ**2m**（最低**1m**））をとる。
  - ・ 入退場時、密にならないように前後の間隔を十分に開けるよう留意する。
- 
- ・ 会期中または会期後（**3/20迄**）に新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、至急、触媒学会事務局にご連絡ください。（E-mail: [catsj@pb3.so-net.ne.jp](mailto:catsj@pb3.so-net.ne.jp)）
  - ・ 法令に基づき地方自治体または保健所から開示要請があった場合は、接触者特定を目的として指定機関へ個人情報を提供させていただく可能性がありますので、予めご了承下さい。

以上